



Association inter villages ZORAMB NAAGTAABA
FERME PILOTE de GUIE (FPG)

Eau, Terre, Verdure.

www.azn-guie-burkina.org

@ZN-FPG brèves Juillet Aout 2010

Excellent maintien de la pluviométrie !

Pluviométrie journalière des mois de Juillet et d'Aout 2010 à Guiè :



Mois de Juillet	
Dates	Millimètres de pluie
2	4
8	15
10	3
11	1
16	14
20	18
22	16
27	35
30	31
TOTAL	137

Mois d'Aout	
Dates	Millimètres de pluie
1	17
2	18
8	40
9	3
10	6
11	52
13	6
14	40
17	20
21	9
28	24
31	13
TOTAL	248 mm



Des pluies catastrophiques sont tombées ces deux derniers mois sur certaines régions du Burkina Faso, notamment dans les régions Centre-Nord et Est du pays, causant de gros dégâts matériels et humains.

A Guiè, la saison pluvieuse s'est bien maintenue, sans excès dévastateurs ; bien que beaucoup de paysans se plaignent de l'excès d'eau qui empêche le sarclage des cultures et favorise le développement des parasites fongiques.



Monsieur Abdoulaye KOMBARI, Ministre Délégué chargé de l'Agriculture, était en visite à Guiè le 19 août, dans le cadre du suivi de la campagne agricole dans la région du Plateau Central. Avec la délégation qui l'accompagnait, il a pu apprécier les techniques de nos champs d'essai ...



... et leur application dans le champ d'un agriculteur de Guiè, Monsieur Ouambi SAWADOGO.



Du fait de la pluviométrie, le déprimage n'a pu se faire que tardivement (le 31 juillet). Nous ne l'avons fait cette année que

sur le mil ; le sorgho étant plus fragile à un stade avancé. L'année prochaine nous ferons d'ailleurs des tests pour voir la limite maximum où le déprimage est possible pour une même date de semis.



Après le passage des animaux, nous avons semé de la dolique dans tous les champs de céréale (*mil et sorgho*), dans le but de voir cette plante se développer après les récoltes (*elle est en effet capable de continuer à pousser durant la saison sèche, jusqu'en janvier, apportant fourrage et protection du sol, ainsi que des nutriments azotés*).