



Association TERRE VERTE Représentation au Burkina Faso

Eau, Terre, Verdure.

La saison agricole 2013 dans nos fermes pilotes bocagères de Guiè, Filly et Goèma (juillet 2013)

Mois de juillet 2013	
Dates	Millimètres de pluie
2	20
5	35
7	4
10	1
14	3
17	6
21	23
24	17
28	8
TOTAL	117


A Guiè, le mois de juillet a été plein d'inquiétudes. En effet, une période sèche de deux semaines a été observée (les pluies des 7, 10, 14 et 17 juillet n'ont pas fait beaucoup mieux que la rosée !); ce qui n'était pas sans créer des peurs chez les agriculteurs. Certains champs ont vu leurs jeunes plants mourir, ce qui oblige à ressemer, en espérant toujours que cette fois-ci sera la bonne ! Par contre les pratiquants du zaï n'ont pas été inquiétés, sauf dans leurs semis



d'arachide, de sésame et autres productions qui ne se font pas avec le zaï. Mais la base de l'alimentation (les céréales), est au moins garantie chaque année !



Fin juillet, le déprimage du mil (semé en zaï dès la fin mai), s'est bien passé du fait d'une végétation abondante et de la sécheresse du sol qui a permis un broutage sans déracinement des pieds de mil.



A Filly, le mois de juillet a été un mois de suspens ! Alors que les agriculteurs l'attendaient pour effectuer les derniers semis et sarcler, ils ont été contraints de scruter chaque jour le ciel dans l'attente de la pluie bienfaitrice qui allait les faire sortir de leur oisiveté et de leur angoisse. Pendant trois semaines les agriculteurs voyaient déjà planer de nouveau à l'horizon le spectre d'une mauvaise campagne agricole ; car entre le 1^{ier} et le 28 juillet, la seule bonne pluie a été celle du 5 juillet avec 25 mm d'eau tombée, puis après, ce fut l'interminable attente d'une pluie digne de ce nom.

dates	Pluviométrie (mm)	Total juillet (mm)
2	7	110
5	25	
7	8	
10	5	
11	2	
17	4	
24	2	
29	37	
31	20	



Dans les champs des agriculteurs, le taux de mortalité des cultures de céréales a varié selon que l'on dispose de bons dispositifs de conservation des eaux de pluies et/ou que l'on pratique ou pas le bon Zaï. Les bons champs de zaï s'en sont sortis tant bien que mal, et les champs sans zaï avec beaucoup plus de peine.

Espérons qu'avec cette pluie de 37 mm du 29 juillet, les pluies seront désormais au rendez-vous jusqu'en fin octobre afin de donner de nouvelles chances de réussite à cette campagne agricole.



A Goëma :

1) La pluviométrie du mois de juillet

Mois	Qté = Quantité ; mm = millimètre ; jrs = jours										Total
juillet	Dates	2	5	7	9	10	17	21	25	28	9 jrs
	Qté (mm)	20	22	5	3	1	5	25	12	19	112

2) Les Champs d'essai

Notre champ d'essai en zaï se développe très bien, car à chaque pluie l'eau est stockée au pied de la plante et l'humidité reste ambiante. Les arbres d'axes des champs ont été plantés ce mois ; 5 espèces d'arbres fruitiers ont été utilisées (nééré, kapokier, tamarinier, baobab et raisinier).



3) Animation dans le périmètre bocager Neerwaya



L'équipe d'animation de la ferme suit les bénéficiaires du périmètre en leur distillant des conseils appropriés pour réussir cette campagne agricole. De l'avis général des bénéficiaires la saison pluvieuse s'est installée très tardivement mais la régularité des pluies dans ce mois redonne espoir à bon nombre d'entre eux.

4) Reboisement

Plus de 2500 plants, à majorité le *Cassia sieberiana* et le *Combretum micranthum*, ont été mis en terre pour renforcer la haie mixte de la ferme et du périmètre bocager de Goëma/Neerwaya.

Nous avons également expérimenté le semi direct d'arbustes sur 800 m de longueur autour des champs d'essai. Les graines ont commencé à germer et les plants se développent bien.

