



Association TERRE VERTE Représentation au Burkina Faso

Eau, Terre, Verdure.

Nouvelles de la saison agricole dans nos fermes pilotes bocagères de Guiè, Filly et Goèma (juin 2013)

A Guiè, la saison a continué sur sa bonne lancée de mai, avec un affaiblissement entre le 8 et le 24, affaiblissement qui a été fatal aux semis pratiqués sans la technique du zaï ; certains agriculteurs étant alors obligés de resemer fin juin. Ce qui fait que les agriculteurs de la zone ne sont pas d'accord sur la qualification du mois de juin : exceptionnellement bon pour certains et catastrophique pour d'autres !

Mois de juin 2013	
Dates	Millimètres de pluie
8	25
11	4
15	11
24	43
27	22
29	33
TOTAL	138



Mil cultivé en zaï (fin juin)



Sorgho cultivé en zaï (fin juin)

En ce mois de juin, nos haies sont magnifiques :



A Filly, c'est la bonne pluie du 4 juin qui a donné cette année le top départ de la campagne agricole 2013.

Cependant, beaucoup de paysans ont manqué à ce rendez-vous, car depuis plus de cinq ans, la saison pluvieuse ne commence réellement

Mois	Jours de pluie	Pluviométrie (mm)	Total/mois (mm)
Juin	4	35	101
	8	3	
	20	18	
	24	12	
	27	33	



que fin juin. Ce constat est certes toujours valable, (les pluies ayant commencé à être régulières durant la 3^{ième} semaine de juin) mais pour les paysans qui ont commencé à semer leurs champs à partir du 4 juin, n'ont plus de semis de céréales à faire, d'où toute l'importance de cette célèbre citation de Jean de la Fontaine : « Rien ne sert de courir, il faut partir à temps ! » Dans nos champs d'essais, nos semis de céréales du 5 juin se développent bien, à part certains poquets

à resemer dans les trous de zaï où les oiseaux et les termites se sont servis !



C'est également en ce mois de juin que nous commençons nos reboisements.

Nous sommes déjà à pied d'œuvre pour mettre en terre nos arbres et arbustes afin qu'ils puissent profiter pleinement de

toutes les eaux de pluies de la saison et qu'ils puissent développer à temps leur système racinaire pour bien passer la longue saison sèche 2013/2014.



A Goèma, on n'a recueilli au mois de juin que 54 millimètres de pluie, répartis en 6 pluies dont la plus abondante est celle du 27 juin.

Mois	Qté = quantité ; mm = millimètre ; jrs = jours							Total
juin	Dates	11	14	18	23	27	29	6 jrs
	Qté (mm)	3	2	1	16	30	2	54



Les semis n'ont démarré qu'après la pluie du 23 juin. Cette année on constate un léger retard sur le début des semis, comparativement aux trois dernières années. Mais on espère une bonne pluviométrie les mois à venir pour compenser ce léger retard.

au sein de la ferme, sur un champ d'un hectare fraîchement aménagé, les variétés locales de sorgho et de mil.

Le champ a été divisé en deux surfaces égales d'un demi-hectare pour chacune des deux productions.



Après avoir creusé les trous du zai avec des dabas, nous avons mis du compost bien décomposé dans chaque trou.

Une nouvelle étude géophysique pour la réalisation du forage de la ferme a été effectuée le 4 juin 2013. Au terme de l'étude, trois points ont été choisis dans la ferme. L'équipe de forage viendra en juillet pour forer l'un des trois points.

On espère que cette fois on aura un forage positif !

